

Védőoltás gyártója	Pfizer-BioNTech	Moderna	Astra-Zeneca	Szputnyik V	Sinopharm
Technológia	Tüskefehérje mRNS	Tüskefehérje mRNS	Tüskefehérje DNS	Tüskefehérje DNS	Inaktivált vírus
Alkalmazhatóság					
Életkori megkötések	16+	18+			
Időskorban	65 éves kor feletti korcsoportban hatásossága nem tér el a fiatalabbaktól.		Hatásossága jelenleg nem becsülhető meg az 55 évnél idősebb korosztályban.	Nem tér el a fiatalabbaktól	60 éves kor feletti korcsoportban hatásossága egyelőre korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre
Akut betegség, láz esetén	Beadását el kell halasztani, ha az egyénnek magas lázzal járó akut betegsége vagy akut fertőzése van. Kiseb fertőzés és/vagy hőemelkedés miatt nem kell az oltást halasztani.	Beadását akut, magas lázzal járó betegség vagy akut fertőzés fennállásakor el kell halasztani. Enyhébb fertőzés és/vagy hőemelkedés miatt nem kell elhalasztani az oltást.	Kezelőorvossal egyeztetni kell a beadásról, ha magas (38 °C feletti) lázzal járó súlyos fertőzése van. Ha viszont csak hőemelkedése vagy enyhe felső légúti fertőzése van, például náthás, akkor megkaphatja az oltást.	Akut, fertőző és nem fertőző betegségek, krónikus betegségek fellángolása – a védőoltás 2-4 héttel a gyógyulás vagy tünetmentessé válás (remisszió) után adható be. Nem súlyos, vírus okozta légzőrendszeri fertőzés vagy akut gyomor-bél rendszeri fertőzés esetén a védőoltás a testhőmérséklet normalizálódása után adható be.	Az oltás beadását el kell halasztani, ha a beoltandó személynél láz, vagy egy betegség akut fázisa jelentkezik.
Krónikus betegség	nincs megszorítás	nincs megszorítás	nincs megszorítás	Krónikus betegségek fellángolása esetén a védőoltás 2-4 héttel a gyógyulás vagy tünetmentessé válás (remisszió) után adható be. Használata ellenjavallt az alábbi betegségekben: - krónikus vesebetegség vagy májbetegség, - endokrin betegségek (jelentős eltérések a pajzsmirigyfunkciós értékekben és nem megfelelően kezelt cukorbetegség), - súlyos vérképzőszervi betegségek, - epilepszia és más központi idegrendszeri betegségek, - autoimmun betegségben szenvedők (az immunrendszer ősztönzése a betegség fellángolásához vezethet); - rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők	Alkalmazása szigorúan tilos, akiknél a krónikus betegség nincs megfelelően egyensúlyban, vagy krónikus betegség akut fellángolása esetén. Körültekintéssel adható, ha az oltandó személy kontrollálatlan epilepsziában vagy egyéb progresszív neurológiai betegségben, vagy vagy Guillain-Barré-szindrómában szenved.
Immunkárosodás, autoimmun betegség	A vakcina hatásosságát, biztonságosságát és immunogénitását nem vizsgálták immunkompromittált személyeknél, beleértve az immunuszuppresszív kezelést kapókat is.	A vakcina hatásosságát, biztonságosságát és immunogénitását nem vizsgálták immunkompromittált személyeknél, beleértve az immunuszuppresszív kezelést kapókat is.	A vakcina hatásosságát, biztonságosságát és immunogénitását nem vizsgálták immunkompromittált személyeknél, beleértve az immunuszuppresszív kezelést kapókat is.	Az immunrendszert gyengítő (immun-szuppresszív) terápiában részesülő betegek, illetve az immunhiányos betegek esetében lehetséges, hogy nem alakul ki megfelelő immunválasz.	Ha az oltandó személy immunuszuppressziós kezelésben részesül vagy immunhiányos, a vakcinára adott immunválasz csökkent mértékű lehet.
Allergia	Nem alkalmazható, ha a páciens allergiás a hatóanyagra vagy a gyógyszer egyéb összetevőjére, bármely más vakcina után vagy a Comirnaty korábbi alkalmazása után súlyos allergiás reakció vagy légzési nehézség lépett fel.	Nem alkalmazható, ha a páciens allergiás a hatóanyagra vagy a gyógyszer egyéb összetevőjére, bármely más vakcina után vagy a COVID-19 Vaccine Moderna korábbi alkalmazása után súlyos allergiás reakció vagy légzési nehézség lépett fel.	Nem alkalmazható, ha a páciens allergiás a hatóanyagra vagy a gyógyszer egyéb összetevőjére, bármely más vakcina után vagy a COVID-19 Vaccine AstraZeneca korábbi alkalmazása után súlyos allergiás reakció vagy légzési nehézség lépett fel.	Használata ellenjavallt korábban előforduló súlyos allergiás reakció esetében.	Használata ellenjavallt a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, illetve ezzel a vakcinával szemben korábban kialakult túlérzékenységi reakció esetén, valamint olyan személyeknél, akiknél korábban vakcinák alkalmazásakor súlyos mellékhatások jelentkeztek.
Terhesség	Nem kizáró ok, de egyéni mérlegelés szükséges.			Terhesség alatt ellenjavallt.	Terhesség alatt nem alkalmazható.
Szoptatás	Nem ismert, hogy kiválasztódik-e a humán anyatejbe.	Nem ismert, hogy kiválasztódik-e a humán anyatejbe.	Nem ismert, hogy kiválasztódik-e a humán anyatejbe.	Szoptatás alatt ellenjavallt.	Szoptatás alatt nem alkalmazható.
Oltási séma - 2 dózis	3 hét különbség	4 hét különbség	4-12 hét különbség	3 hét különbség	3-4 hét különbség

Kezelőorvos = oltást beadó orvos. Forrás: alkalmazási előírások. Lezárás: 2021.02.25.